

Var god visa upp det här kortet för
den sjukvårdspersonal som behandlar dig



Risk för överkänslighet mot spår av kaninproteiner – försiktighet vid användning

Den här patienten har ordinerats Ruconest™ för behandling av akuta attacker av arvetärt angioödem. Ruconest™ är en rekombinant C1-esteras-hämmare, som erhållits från mjölk från genmodifierade kaniner och innehåller spår av kaninproteiner. Innan behandlingen av den här patienten påbörjades, testades patienten negativt för IgE mot kanin-epitel (kaninmjäll). Detta test skall upprepas årligen eller efter 10 behandlingar, det som först inträffar, eller om symptom på kaninallergi utvecklas.

Var god följ alltid noga nedanstående rutiner vid behandling av den här patienten:

1. Övervaka patienten med avseende på kliniska tecken och symptom på överkänslighet.
2. Administrera omedelbart akutvård vid anafylaktiska reaktioner eller chocktillstånd.
3. Informera patienten om de allmänna tecknen på en överkänslighetsreaktion, t ex nässelutslag, generaliserad urticaria, tryck över bröstet, väsljud, hypertoni och anafylaxi, och om att kontakta sjukvården om något av dessa symptom uppstår. Diskutera med patienten vilken skillnaden är från en arvetärt angioödem-attack.
4. Be patienten att han/hon alltid bär med sig detta kort och visar upp det för den sjukvårdspersonal som behandlar honom/henne för akuta attacker av arvetärt angioödem.

Mer information finns i utbildningsmaterialet och i produktresumén, samt kan erhållas från din lokala representant Swedish Orphan Biovitrum, telefonnummer: 08-697 20 00.

**Jag har en sjukdom som heter
hereditärt angioödem (HAE)**

Patientens namn _____

Personnummer _____

Vikt _____

Min HAE-specialist eller -vårdgivare är

Namn _____

Telefonnummer _____

Jag har fått diagnosen hereditärt angioödem (HAE), som yttrar sig som återkommande, ödematösa attacker orsakade av en brist på endogen C1-esterashämmare. Om jag inte erhåller korrekt behandling, kan HAE-attackerna allvarligt påverka mitt hälsotillstånd om den ödematösa svullnaden uppstår i t ex orofarynx och/eller larynx.

Datum och resultatet för mitt senast tagna IgE anti-kroppstest mot kaninepitel (kaninmjäll)

Datum _____

Resultat _____

**Datum och Ruconest™-dos som använts
under mina tidigare behandlingar**

Behandlingsnr. och -datum mm/dd/åå	Dose	Behandlingsnr. och -datum mm/dd/åå	Dose
1 _____	____ U	6 _____	____ U
2 _____	____ U	7 _____	____ U
3 _____	____ U	8 _____	____ U
4 _____	____ U	9 _____	____ U
5 _____	____ U	10 _____	____ U

Uppsök din läkare för att upprepa IgE-testet efter var 10:e Ruconest™-behandling, eller om ditt senaste IgE-test togs för över ett år sedan, eller om du misstänker att du har utvecklat en kaninallergi. Läs också den ytterligare information som finns i bipacksedeln.